












Ваша ситуация	Наша настоятельная рекомендация: пройдите следующую вакцинацию	 Минимальная разница по времени
Еще нет 	0 вакцинаций <ul style="list-style-type: none"> • Как можно быстрее пройдите вашу 1-ю вакцинацию 	Как можно быстрее
1 	1 вакцинация: Pfizer, Moderna Astrazeneca <ul style="list-style-type: none"> • Пройдите 2-ю вакцинацию 	3 недели между 1-й и 2-й вакцинацией (в случае Moderna и Astrazeneca 4 недели)
1 	1 вакцинация: Janssen <ul style="list-style-type: none"> • Пройдите ревакцинацию 	через 3 месяца после последней вакцинации или ревакцинации
 → 1 	Сначала болели ковидом, потом вакцинация <ul style="list-style-type: none"> • Пройдите ревакцинацию 	через 3 месяца после последней вакцинации или ревакцинации
1  → 	1 вакцинация Pfizer, Moderna или Astrazeneca и потом болели ковидом? <ul style="list-style-type: none"> • Пройдите 2-ю вакцинацию 	с интервалом 2 месяца между выздоровлением и 2-й вакцинацией (в случае госпитализации: через 3 месяца после выздоровления)
2 	2 вакцинации Pfizer, Moderna Astrazeneca <ul style="list-style-type: none"> • Пройдите ревакцинацию 	через 3 месяца после последней вакцинации или ревакцинации
 → 	2 вакцинации Pfizer, Moderna или Astrazeneca и потом болели ковидом? <ul style="list-style-type: none"> • Пройдите ревакцинацию 	с интервалом 3 месяца между выздоровлением и ревакцинацией